

Magen-Darm-Beschwerden

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten, oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, Apothekerin oder Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Wann wird SIMILASAN Magen-Darm-Beschwerden angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann SIMILASAN Magen-Darm-Beschwerden angewendet werden bei:

- Magen-Darm-Entzündungen mit: Übelkeit, Erbrechen, Durchfall; krampfartigen Schmerzen (Kolik); Appetitlosigkeit und Abneigung gegen Speisen; Erschöpfungszuständen und Unruhe; Aufstossen, aufgetriebenem, berührungsempfindlichem Bauch
- Akuten Magen-Darm-Katarrhen mit: Stark stinkendem, schleimigem oder wässrigem, wundmachendem Durchfall; Krämpfen und Stuhldrang; Erbrechen
- Magen-Darm-Beschwerden nach Genuss von: Kalten Getränken und Speisen (Eis); sauren Speisen, Obst und anderen wässrigen Früchten; schlecht verträglichen Speisen

Was sollte dazu beachtet werden?

- Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob SIMILASAN Magen-Darm-Beschwerden gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf SIMILASAN Magen-Darm-Beschwerden nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

- Verdauungsbeschwerden bei Kindern unter 12 Jahren sind ärztlich abzuklären. Deshalb soll das Präparat bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne ärztliche Abklärung angewendet werden.
- Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an andern Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Wie verwenden Sie SIMILASAN Magen-Darm-Beschwerden?

Falls vom Arzt oder der Ärztin nicht anders verschrieben:
Kinder und Erwachsene: 7 Globuli (Kügelchen) pro Gabe.

- Akute Beschwerden: Viertel- oder halbstündlich. Mit zunehmender Besserung weniger häufig.
- Leichte Beschwerden und zum Ausheilen: 3 – 6 mal täglich.

Einnahmehinweise:

- Globuli (Kügelchen) im Mund zergehen lassen.
- Darf auch auf nüchternen Magen eingenommen werden.

Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Grundsätzlich wird die Einnahme des Präparates bei Nachlassen der Wirkung oder bei Rückkehr der Beschwerden wiederholt. Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen.

Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann SIMILASAN Magen-Darm-Beschwerden haben?

Für SIMILASAN Magen-Darm-Beschwerden sind bisher bei bestimmungsgemässen Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

Massnahmen bei anfänglicher Symptomverstärkung:

1. Präparat nicht mehr einnehmen bis die Reaktion abgeklungen ist.
2. Einmal 7 Globuli einnehmen. Wirkung abwarten.
3. Bei Wiederholung der Reaktion gleiches Verhalten wie unter 1. und 2. beschrieben.
4. Wird keine Reaktion mehr verspürt, die Empfindungen unter «Wie verwenden Sie ...» einhalten.

Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie SIMILASAN Magen-Darm-Beschwerden ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

- Zuckerrfrei. Mit Xylit.
- Vor Kindern geschützt aufbewahren.
- Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «Exp.» bezeichneten Datum verwendet werden.
- Bei Raumtemperatur (15 – 25 °C) lagern.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in SIMILASAN Magen-Darm-Beschwerden enthalten?

Globuli enthalten: Arsenicum album (Acidum arsenicosum) D6 / Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha) D6 / Mercurius sublimatus corrosivus (Hydrargyrum bichloratum) D6 / Podophyllum peltatum D6 zu gleichen Teilen. Das Präparat enthält als Hilfsstoffe: Xylit und Calciumcarbonat.

Zulassungsnummer:

50868 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie SIMILASAN Magen-Darm-Beschwerden? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.
Packungsgrössen: 15 g,
4,5 g (nur als Bestandteil der Reise- und der Taschen-Apotheke)

Zulassungsinhaber:

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Diese Packungsbeilage wurde im Februar 2009 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Voies digestives

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, pharmacien ou droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Quand SIMILASAN voies digestives est-il utilisé ?

Conformément au schéma thérapeutique homéopathique SIMILASAN voies digestives peut être utilisé en cas de :

- Inflammations des voies digestives, avec : Nausées, vomissements, diarrhées ; Douleurs convulsives (coliques) ; Manque d'appétit ou dégoût de la nourriture ; Etat d'épuisement ou nervosité ; Renvois aigres, abdomen ballonné et douloureux au toucher
- Gastro-entérites aiguës, avec : Diarrhées fortement nauséabondes, mousseuses ou liquides, irritantes ; Crampes et faux besoin d'aller à la selle ; Vomissements
- Troubles digestifs après absorption de : Boissons ou mets froids (glaces) ; Mets acides, fruits à pépins ou à teneur élevée en eau ; Aliments mal supportés

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

- Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou pharmacien si SIMILASAN voies digestives peut être pris simultanément.

Quand SIMILASAN voies digestives ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?

- Les troubles de la digestion des enfants de moins de 12 ans doivent faire l'objet d'une exploration médicale. Pour cette raison, cette préparation ne doit pas être administrée aux enfants de moins de 12 ans sans exploration médicale préalable.
- Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication) !

Comment utiliser SIMILASAN voies digestives ?

Sauf prescription contraire du médecin :

- Enfants et adultes : 7 globules par prise.
- Troubles aigus : Tous les quarts ou toutes les demi-heures. Réduire la fréquence au fur et à mesure de l'amélioration des troubles.
- Troubles légers et pour parachever la guérison : 3 – 6 fois par jour.

Mode d'emploi :

- Laisser fondre les globules dans la bouche.
- Les globules peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou lorsque les troubles reviennent. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si l'amélioration escomptée de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin. Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou droguiste si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires SIMILASAN voies digestives peut-il provoquer ?

Lors d'un emploi approprié, aucun effet secondaire indésirable n'a été constaté jusqu'à ce jour pour SIMILASAN voies digestives. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Lors de la prise de médicaments homéopathiques, les troubles peuvent s'aggraver passagèrement (aggravation initiale).

Mesures en cas d'aggravation des symptômes au début du traitement :

1. Suspendre l'administration de la préparation jusqu'à ce que la réaction thérapeutique ait cessé.
2. Prendre une fois 7 globules. Attendre la réaction.
3. Si la réaction se répète, agir comme indiqué sous points 1. et 2.
4. Si vous ne ressentez aucune réaction, respectez les recommandations mentionnées sous « Comment utiliser ... ».

Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec SIMILASAN voies digestives et informez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention ?

- Sans sucre. Avec xylite.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention « Exp. » sur le récipient.
- Conserver à température ambiante entre 15 et 25° C.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient SIMILASAN voies digestives ?

Les globules contiennent : Arsenicum album (Acidum arsenicosum) D6 / Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha) D6 / Mercurius sublimatus corrosivus (Hydrargyrum bichloratum) D6 / Podophyllum peltatum D6 à parts égales.

La préparation contient en tant qu'excipients : xylite et carbonate de calcium.

Numéro d'autorisation :

50868 (Swissmedic)

Où obtenez-vous SIMILASAN voies digestives ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.
Conditionnements : 15 g
4,5 g (seulement si fait partie de la pharmacie de voyage et de la pharmacie de poche)

Titulaire de l'autorisation :

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Cette notice d'emballage a été contrôlée par l'autorité des médicaments (Swissmedic) en février 2009.

Disturbi gastrointestinali

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente questo prospetto, perché contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente dal suo medico oppure è stato da lei acquistato in farmacia o drogheria senza ricetta medica. Per ottenere il massimo giovamento da questo preparato, lo utilizzi come descritto nel prospetto interno ovvero attenendosi alle istruzioni che ha ricevuto dal medico, farmacista o dal droghiere. Abbia cura di conservare il prospetto del medicamento, perché eventualmente lo vorrà leggere ancora in un secondo tempo.

Quando si usa SIMILASAN disturbi gastrointestinali?

Secondo i principi farmacologici dell'omeopatia, SIMILASAN disturbi gastrointestinali trova impiego nei casi di:

- Infiammazioni gastrointestinali accompagnate da: Nausea, vomito, diarrea; Crampi (coliche) e bruciori; Mancanza di appetito e avversione nei confronti di alcuni cibi; Stato di esaurimento e agitazione; Eruttazione, ventre dilatato e sensibile al tatto
- Catarro acuto gastrointestinale accompagnato da: Diarrea che provoca lesioni, molto maleodorante, viscida o acquosa; Crampi e tenesmo anale (bisogno continuo di defecare); Vomito
- Disturbi gastrointestinale causati da: Bevande e cibo ghiacciato (gelato); Cibo acido, frutta che contiene molto acqua; Cibo indigesto

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

- Qualora siano stati prescritti altri medicinali da parte del medico curante, consultare il medico o il farmacista per sapere se è possibile usare contemporaneamente anche SIMILASAN disturbi gastrointestinali.

Quando non si può assumere SIMILASAN disturbi gastrointestinali e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

- In presenza di disturbi digestivi nei bambini al di sotto dei 12 anni, è necessario che un medico ne accerti la causa. Perciò, questo preparato non deve essere impiegato nei bambini al di sotto dei 12 anni senza aver consultato un medico.
- Informi il suo medico, farmacista o droghiere se

- soffre di altre malattie,
- ha qualche allergia oppure,
- prende o applica esternamente (nel caso dei preparati esterni) altri medicinali!

Come usare SIMILASAN disturbi gastrointestinali?

Salvo diversa prescrizione medica:

- Bambini e adulti: 7 globuli per ogni somministrazione.
- Disturbi acuti: Ogni quarto d'ora – mezz'ora. Diminuire la frequenza non appena sopraggiunge un miglioramento.
- Disturbi leggeri e per la completa guarigione: 3 – 6 volte al giorno.

Avvertenze per l'assunzione:

- Far sciogliere in bocca i globuli.
- L'assunzione può avvenire anche a stomaco vuoto.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

Se il trattamento riguarda un bambino e non si ottiene il miglioramento desiderato, il bambino deve essere visitato da un medico.

Se ritiene che il medicamento agisca troppo o troppo poco, ne parli al medico, al farmacista o al droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN disturbi gastrointestinali?

Non sono stati finora osservati effetti collaterali in seguito all'impiego corretto di SIMILASAN disturbi gastrointestinali. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, farmacista o droghiere.

L'assunzione di preparati omeopatici può dar luogo a una temporanea intensificazione dei sintomi (peggioramento iniziale).

Cosa fare quando i sintomi si acutizzano:

1. Interrompere la somministrazione fino a quando la reazione si affievolisce.
2. Prendere in una volta sola 7 globuli e aspettare l'effetto.
3. Se la reazione si ripete, comportarsi come descritto ai punti 1. e 2.
4. Se non si avverte più alcuna reazione, attenersi alle raccomandazioni descritte al paragrafo «Come usare ...».

Qualora il peggioramento dovesse persistere, interrompere l'assunzione di SIMILASAN disturbi gastrointestinali e consultare il medico, il farmacista o il droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

- Senza zucchero. Con xilitolo.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il preparato può essere somministrato solo fino alla data <Exp.> indicata sulla confezione.
- Conservare a temperatura ambiente (15 – 25 °C).

Ulteriori informazioni possono essere fornite dal medico, dal farmacista o dal droghiere.

Cosa contiene SIMILASAN disturbi gastrointestinali?

Globuli contengono: Arsenicum album (Acidum arsenicosum) D6 / Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha) D6 / Mercurius sublimatus corrosivus (Hydrargyrum bichloratum) D6 / Podophyllum peltatum D6 in parti uguali. Il preparato contiene come eccipienti: xilitolo e carbonato di calcio.

Numero dell'omologazione:

50868 (Swissmedic)

Dove è ottenibile SIMILASAN disturbi gastrointestinali? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e drogheria, senza ricetta medica.

Confezioni: 15 g

4,5 g (solo come parte integrante della farmacia da viaggio e della farmacia tascabile)

Titolare dell'autorizzazione:

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglio illustrativo è stato controllato per l'ultima volta nel febbraio 2009 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

Gastrointestinal disorders

Information for patients

Read this package leaflet carefully since it contains important information. This medicine has either been prescribed for you personally by your doctor, or you have purchased it from a pharmacist or druggist without a medical prescription. In order to obtain the greatest benefit from this medicine, use it according to this package leaflet or as directed by your doctor, pharmacist or druggist. Keep this package leaflet safe, you may want to read it again later.

When should SIMILASAN gastrointestinal disorders be taken?

In accordance with homeopathic principles, SIMILASAN gastrointestinal disorders can be used in cases of:

- Gastro-intestinal inflammation, with: Nausea, vomiting, diarrhea; Stomach cramps, colic, or stomach pain; Lack of appetite, aversion to food; Exhaustion and restlessness; Eructation (belching), bloated, tender stomach
- Acute gastro-intestinal catarrh, with: Malodorous, mucous, or watery diarrhea with anal soreness; Cramps and tenesmus; Vomiting
- Gastro-intestinal disorders after consumption of: Cold fruit or drink, ice cream; Acid foods, fruit, berries; Indigestible foods

What precautions should be taken?

- If your physician has prescribed other medications, please ask him/her or your pharmacist if you may use SIMILASAN gastrointestinal disorders at the same time.

When must SIMILASAN gastrointestinal disorders not be taken or taken only with caution?

- Indigestion in children under the age of 12 should be clinically investigated. For this reason, the preparation should not be used in children under the age of 12 without a clinical investigation.
- Tell your doctor, pharmacist or druggist if you

- are suffering from any other diseases or illnesses,
- have allergies or
- are taking other medicines (even those you have bought yourself) by mouth or using them externally!

How do you take SIMILASAN gastrointestinal disorders?

Unless prescribed differently by your physician: Children and adults: 7 globules (small spheres) per dose.

- Acute phase: Take quarter- to half-hourly, less frequently as the symptoms improve.
- For slight disorders and during resolution: 3 – 6 times a day.

Instructions for use:

- Allow the globules (small spheres) to dissolve in the mouth.
- The preparation may also be taken on an empty stomach.

The period of effectiveness of a medical preparation can vary from person to person. As a rule, always begin another course of treatment when the effect wears off or the symptoms recur.

Keep to the dosage given in the package leaflet or prescribed by your doctor. If no improvement is seen in a child, seek the advice of a doctor.

If you think that the medicine is working too little or too strongly, talk to your doctor, pharmacist or druggist.

What side effects can SIMILASAN gastrointestinal disorders have?

No incidents of side effects have been reported for SIMILASAN gastrointestinal disorders provided the correct dosage is adhered to and the precautionary measures are observed. However, please inform your doctor, pharmacist or druggist if you should notice any side effect. When taking homeopathic medication, the symptoms may at first become more pronounced for a short period (initial exacerbation).

Measures to take in the case of initial worsening of symptoms:

1. Stop taking the preparation until the reaction has ceased.
2. Take a single dose of 7 globules and wait for reaction.
3. If the reaction recurs, proceed as described in 1. and 2. above.
4. If the reaction does not recur, follow the instructions mentioned in "How do you take ...".

Should the worsening of symptoms persist, stop taking SIMILASAN gastrointestinal disorders and inform your physician, pharmacist or druggist.

What should also be taken into consideration?

- Sugar-free. With xylitol.
- Keep out of the reach of children.
- The medication may only be taken until the expiry date marked <Exp.> on the container.
- Store at room temperature (15 – 25 °C).

Further information can be obtained from your physician, pharmacist or druggist.

What does SIMILASAN gastrointestinal disorders contain?

The globules contain: Arsenicum album (Acidum arsenicosum) D6 / Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha) D6 / Mercurius sublimatus corrosivus (Hydrargyrum bichloratum) D6 / Podophyllum peltatum D6 in equal proportions. The medication contains as excipients: xylitol and calcium carbonate.

Product licence No.:

50868 (Swissmedic)

Where can you obtain SIMILASAN gastrointestinal disorders? How is the preparation presented?

In pharmacies and drugstores, without medical prescription.

Package sizes: 15 g

4,5 g (only as part of the Travel Medical Kit and Pocket Medical Kit)

Holder of the product licence:

Similasan AG, CH-8916 Jonen

The latest examination of this package leaflet was carried out in February 2009 by the Federal Authorities for Medication (Swissmedic).