

Magenbrennen**Information für Patientinnen und Patienten**

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten, oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäß Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogistin an, um den größten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Wann wird SIMILASAN Magenbrennen angewendet?

Gemäß homöopathischem Arzneimittelbild kann SIMILASAN Magenbrennen angewendet werden bei:

- Magenbrennen (Sodbrennen)
- Magenübersäuerung und saurem Aufstossen
- Magen-Darm-Gärung mit saurem Aufstossen
- Magenbrennen nach übermässigem Kaffee-, Tabak- und Alkoholgenuss

Was sollte dazu beachtet werden?

- Wenn die Beschwerden ununterbrochen anhalten und nach zwei Wochen keine Besserung eingetreten ist, ist ein Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen.
- Kaffee-, Tabak- und Alkoholgenuss sollten vermieden werden.
- Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob SIMILASAN Magenbrennen gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf SIMILASAN Magenbrennen nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen werden?

- Bis heute sind keine Anwendungseinschränkungen bekannt. Bei bestimmungsgemässem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen notwendig.
- Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Droguistin, wenn Sie
 - an andern Krankheiten leiden,
 - Allergien haben oder
 - andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnehmen oder äußerlich anwenden!

Globuli

Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie SIMILASAN Magenbrennen ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Droguistin bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Droguistin.

Was ist ferner zu beachten?

- Zuckerfrei. Mit Xylit.
- Vor Kindern geschützt aufbewahren.
- Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit <Exp.> bezeichneten Datum verwendet werden.
- Bei Raumtemperatur (15 – 25 °C) lagern.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Droguist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Droguistin.

Was ist in SIMILASAN Magenbrennen enthalten?

Globuli enthalten: Calcium carbonicum Hahnemann D15 / Natrium phosphoricum D12 / Nux vomica (Strychnos nux-vomica) D10 zu gleichen Teilen. Das Präparat enthält als Hilfsstoffe: Xylit und Calciumcarbonat.

Zulassungsnummer:

53179 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie SIMILASAN Magenbrennen?**Welche Packungen sind erhältlich?**

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Packungsgrößen: 15 g
4,5 g (nur als Bestandteil der Reiseapotheke)

Zulassungsinhaberin:

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Diese Packungsbeilage wurde im November 2004 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Médicament homéopathique**Similasan****Brûlures d'estomac****Globules****Information destinée aux patients**

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, pharmacien ou droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Quand SIMILASAN brûlures d'estomac est-il utilisé ?

Conformément au schéma thérapeutique homéopathique SIMILASAN brûlures d'estomac peut être utilisé en cas de :

- Brûlures d'estomac (pyrosis)
- Excès d'acide gastrique et renvois acides
- Ballonnements stomacaux ou intestinaux avec renvois acides
- Brûlures à l'estomac après une consommation excessive de café, de tabac et d'alcool

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

- Si les troubles devaient persister sans interruption et si aucune amélioration ne devait intervenir après deux semaines, consulter un médecin.
- Eviter le café, le tabac et l'alcool.
- Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou pharmacien si SIMILASAN brûlures d'estomac peut être pris simultanément.

Quand SIMILASAN brûlures d'estomac ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?

- Aucune limitation d'emploi n'est connue à ce jour.
- Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.
- Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si
 - vous souffrez d'une autre maladie,
 - vous êtes allergique,
 - vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication) !

Comment utiliser SIMILASAN brûlures d'estomac ?

Sauf prescription contraire du médecin:

Adolescents et adultes : 7 globules par prise.

- Troubles aigus : Plusieurs fois par jour (jusqu'à chaque quart d'heure).
- Pour parachever la guérison : 3 fois par jour.

Mode d'emploi :

- Laisser fondre les globules dans la bouche.
- Les globules peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

Le temps de l'effet d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou lorsque les troubles reviennent. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou droguiste si vous estimatez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires SIMILASAN brûlures d'estomac peut-il provoquer ?

Lors d'un emploi approprié, aucun effet secondaire indésirable n'a été constaté jusqu'à ce jour pour SIMILASAN brûlures d'estomac. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Lors de la prise de médicaments homéopathiques, les troubles peuvent s'aggraver passagèrement (aggravation initiale).

Mesures en cas d'aggravation des symptômes au début du traitement :

1. Suspendre l'administration de la préparation jusqu'à ce que la réaction thérapeutique ait cessé.
2. Prendre une fois 7 globules. Attendre l'effet.
3. Si la réaction se répète, agir comme indiqué sous points 1. et 2.
4. Si vous ne ressentez aucune réaction, respectez les recommandations mentionnées sous « Comment utiliser ... ».

Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec SIMILASAN brûlures d'estomac et informez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention ?

- Sans sucre. Avec xylite.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention < Exp. > sur le récipient.
- Conserver à température ambiante entre 15 et 25 °C.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient SIMILASAN brûlures d'estomac ?

Les globules contiennent: Calcium carbonicum Hahnemann D15 / Natrium phosphoricum D12 / Nux vomica (Strychnos nux-vomica) D10 à parts égales. La préparation contient en tant qu'excipients : xylite et carbonate de calcium.

Numéro d'autorisation :

53179 (Swissmedic)

Où obtenez-vous SIMILASAN brûlures d'estomac ?**Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?**

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnements : 15 g

4,5 g (seulement si fait partie de la pharmacie de voyage)

Titulaire de l'autorisation :

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Cette notice d'emballage a été contrôlée par l'autorité des médicaments (Swissmedic) en novembre 2004.

Bruciori di stomaco**Informazione destinata ai pazienti**

Lega attentamente questo prospetto, perché contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente dal suo medico oppure è stato da lei acquistato in farmacia o drogheria senza ricetta medica. Per ottenere il massimo giovamento da questo preparato, lo utilizzi come descritto nel prospetto interno ovvero attenendosi alle istruzioni che ha ricevuto dal medico, farmacista o dal droghiere. Abbia cura di conservare il prospetto del medicamento, perché eventualmente lo vorrà leggere ancora in un secondo tempo.

Quando si usa SIMILASAN bruciori di stomaco?

Secondo i principi farmacologici dell'omeopatia, SIMILASAN bruciori di stomaco trova impiego nei casi di:

- Bruciore di stomaco (pirosi)
- Acidità di stomaco
- Fermentatione gastro-intestinale accompagnata da acidità di stomaco
- Bruciore di stomaco dopo il consumo eccessivo di caffè, tabacco e alcolici

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

- Rivolgersi ad un medico se i disturbi persistono senza interruzione e non si osserva alcun miglioramento nel giro di due settimane.
- Si consiglia di evitare il consumo di caffè, tabacco e alcolici.
- Qualora siano stati prescritti altri medicinali da parte del medico curante, consultare il medico o il farmacista per sapere se è possibile assumere contemporaneamente anche SIMILASAN bruciori di stomaco.

Quando non si può assumere SIMILASAN bruciori di stomaco e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

- Fino ad oggi non si conoscono controindicazioni. Non sono necessarie precauzioni particolari, a condizione che il preparato sia usato correttamente.
- Informi il suo medico, farmacista o droghiere se
 - soffre di altre malattie,
 - ha qualche allergia oppure,
 - prende altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Come usare SIMILASAN bruciori di stomaco?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Giovani e adulti: 7 globuli per ogni somministrazione.

- Disturbi acuti: Più volte al giorno (fino ad ogni quarto d'ora).
- Per la completa guarigione: 3 volte al giorno.

Avvertenze per l'assunzione:

- Lasciar sciogliere i globuli in bocca.
- Può essere somministrato anche a stomaco vuoto.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

Se ritiene che il medicamento agisca troppo o troppo poco, ne parli al medico, al farmacista o al droghiere.

L'assunzione di preparati omeopatici può dar luogo a una temporanea intensificazione dei sintomi (peggioramento iniziale).

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN bruciori di stomaco?

Non sono stati finora osservati effetti collaterali in seguito all'impiego corretto di SIMILASAN bruciori di stomaco. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, farmacista o droghiere.

L'assunzione di preparati omeopatici può dar luogo a una temporanea intensificazione dei sintomi (peggioramento iniziale).

Cosa fare quando i sintomi si acutizzano:

1. Interrompere la somministrazione fino a quando la reazione si affievolisce.
2. Prendere in una volta sola 7 globuli e aspettare l'effetto.
3. Se la reazione si ripete, comportarsi come descritto ai punti 1. e 2.
4. Se non si avverte più alcuna reazione, attenersi alle raccomandazioni descritte al paragrafo «Come usare ...».

Qualora il peggioramento dovesse persistere, interrompere l'assunzione di SIMILASAN bruciori di stomaco e consultare il medico, il farmacista o il droghiere.

Globuli**Di che altro occorre tener conto?**

- Senza zucchero. Con xilitolo.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il preparato può essere somministrato solo fino alla data <Exp.> indicata sulla confezione.
- Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C).

Ulteriori informazioni possono essere fornite dal medico, dal farmacista o dal droghiere.

Cosa contiene SIMILASAN bruciori di stomaco?

Globuli contengono: Calcium carbonicum Hahnemann D15 / Natrium phosphoricum D12 / Nux vomica (Strychnos nux-vomica) D10 in parti uguali. Il preparato contiene come excipienti: xilitolo e carbonato di calcio.

Numeri dell'omologazione:

53179 (Swissmedic)

Dove è ottenibile SIMILASAN bruciori di stomaco?**Quali confezioni sono disponibili?**

In farmacia e drogheria, senza prescrizione medica. Confezioni: 15 g
4,5 g (solo come parte integrante della farmacia di viaggio)

Titolare dell'autorizzazione:

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglio illustrativo è stato controllato per l'ultima volta nel novembre 2004 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

Globules**Heartburn****Globules****Information for patients**

Read this package leaflet carefully since it contains important information. This medicine has either been prescribed for you personally by your doctor, or you have purchased it from a pharmacist or druggist without a medical prescription. In order to obtain the greatest benefit from this medicine, use it according to this package leaflet or as directed by your doctor, pharmacist or druggist. Keep this package leaflet safe, you may want to read it again later.

When should SIMILASAN heartburn be taken?

In accordance with homeopathic principles, SIMILASAN heartburn can be taken in cases of:

- Heartburn
- Hyperacidity and acid eructation
- Gastrointestinal fermentation accompanied by acid eructation
- Heartburn caused by excessive consumption of coffee, tobacco products and alcohol

What precautions should be taken?

- Consult a doctor if the symptoms incessantly persist and there is no improvement after two weeks.
- Smoking and the consumption of coffee and alcoholic beverages should be avoided.
- If your physician has prescribed other medications, please ask him/her or your pharmacist if you may take SIMILASAN heartburn at the same time.

When must SIMILASAN heartburn not be used or used only with caution?

- There are no known restrictions on use at present. When used as recommended, no particular precautionary measures are necessary.
- Tell your doctor, pharmacist or druggist if you
 - are suffering from any other diseases or illnesses,
 - have allergies or
 - are taking other medicines (even those you have bought yourself) by mouth or using them externally!

How do you take SIMILASAN heartburn?

Unless prescribed differently by your physician:

Adolescents and adults: 7 globules (small spheres) per dose.

- Acute phase: Several times a day (up to every quarter hour).
- During resolution: Take 3 times daily.

Instructions for use:

- Allow the globules (small spheres) to dissolve in the mouth.
- The preparation may also be taken on an empty stomach.

The period of effectiveness of a medical preparation can vary from person to person. As a rule, always begin another course of treatment when the effect wears off or the symptoms recur. Keep to the dosage given in the package leaflet or prescribed by your doctor.

If you think that the medicine is working too little or too strongly, talk to your doctor, pharmacist or druggist.

What side effects can SIMILASAN heartburn have?

No incidents of side effects have been reported for SIMILASAN heartburn provided the correct dosage is adhered to and the precautionary measures are observed.

However, please inform your doctor, pharmacist or druggist if you should notice any side effect. When taking homeopathic medication, the symptoms may at first become more pronounced for a short period (initial exacerbation).

Measures to take in the case of initial worsening of symptoms:

1. Stop taking the preparation until the reaction has ceased.
2. Take a single dose of 7 globules and wait for reaction.
3. If the reaction recurs, proceed as described in 1. and 2. above.
4. If the reaction does not recur, follow the instructions mentioned in "How do you take ...".

Should the worsening of symptoms persist, stop taking SIMILASAN heartburn and inform your physician, pharmacist or druggist.

What should also be taken into consideration?

- Sugar-free. With xylitol.
- Keep out of the reach of children.
- This preparation must not be used after the expiry date indicated as <Exp.> on the container.
- Store at room temperature (15–25 °C).

Further information can be obtained from your physician, pharmacist or druggist.

What does SIMILASAN heartburn contain?

The globules contain: Calcium carbonicum Hahnemann D15 / Natrium phosphoricum D12 / Nux vomica (Strychnos nux-vomica) D10 in equal proportions.

The medication contains as excipients: xylitol and calcium carbonate.

Product licence No.:

53179 (Swissmedic)

Where can you obtain SIMILASAN heartburn?**How is the preparation presented?**

In pharmacies and drugstores, without medical prescription.

Package sizes: 15 g
4,5 g (only as part of the Travel Medical Kit).

Holder of the product licence:

Similasan AG, CH-8916 Jonen

The latest examination of this package leaflet was carried out in November 2004 by the Federal Authorities for Medication (Swissmedic).