

**Magenbrennen****Tabletten****Information für Patientinnen und Patienten**

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten, oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäß Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogistin bzw. der Ärztin, Apothekerin oder Drogistin an, um den größten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

**Wann wird SIMILASAN Magenbrennen angewendet?**

Gemäß homöopathischem Arzneimittelbild kann SIMILASAN Magenbrennen angewendet werden bei:

- Magenbrennen (Sodbrennen)
- Magenübersäuerung und saurem Aufstossen
- Magen-Darm-Gärung mit saurem Aufstossen
- Magenbrennen nach übermässigem Kaffee-, Tabak- und Alkoholgenuss

**Was sollte dazu beachtet werden?**

- Wenn die Beschwerden ununterbrochen anhalten und nach zwei Wochen keine Besserung eingetreten ist, ist ein Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen.
- Kaffee-, Tabak- und Alkoholgenuss sollten vermieden werden.
- Dieses Arzneimittel enthält 0,24 g verwertbare Kohlenhydrate pro Einzeldosis.
- Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob SIMILASAN Magenbrennen gleichzeitig eingenommen werden darf.

**Wann darf SIMILASAN Magenbrennen nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?**

- Bis heute sind keine Anwendungseinschränkungen bekannt. Bei bestimmungsgemässem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen notwendig.

- Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie
  - an anderen Krankheiten leiden,
  - Allergien haben oder
  - andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte) einnehmen oder äußerlich anwenden!

**Wie verwenden Sie SIMILASAN Magenbrennen ?**

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben:

Erwachsene und Kinder:

- Akute Beschwerden: Mehrmals täglich (bis viertelstündlich) 1 Tablette.
- Zum Ausheilen: 3 mal 1 Tablette täglich.

**Einnahmehinweise:**

- Tablette im Mund zergehen lassen (eventuell kauen) und mit der Zunge auf die umliegenden Schleimhäute verteilen.
- Darf auch auf nüchternen Magen eingenommen werden.

Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Grundsätzlich wird die Einnahme des Präparates bei Nachlassen der Wirkung oder bei Rückkehr der Beschwerden wiederholt. Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder Ärztin verschriebene Dosierung.

Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes/ Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

**Welche Nebenwirkungen kann SIMILASAN Magenbrennen haben?**

Für SIMILASAN Magenbrennen sind bisher bei bestimmungsgemässem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

**Massnahmen bei anfänglicher Symptomverstärkung:**

1. Präparat nicht mehr einnehmen bis die Reaktion abgeklungen ist.
2. Einmal 1 Tablette einnehmen. Wirkung abwarten.
3. Bei Wiederholung der Reaktion gleiches Verhalten wie unter 1. und 2. beschrieben.
4. Wird keine Reaktion mehr verspürt, die Empfehlungen unter "Wie verwenden Sie ..." einhalten.

Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie SIMILASAN Magenbrennen ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

**Was ist ferner zu beachten?**

- Vor Kindern geschützt aufbewahren.
- Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit <Exp.> bezeichneten Datum verwendet werden.
- Bei Raumtemperatur (15–25 °C) lagern.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

**Was ist in SIMILASAN Magenbrennen enthalten?**

1 Tablette enthält: Calcium carbonicum Hahnemannii D15 / Natrium phosphoricum D12 / Nux vomica (Strychnos nux-vomica) D10 zu gleichen Teilen 8,33 mg.  
Hilfsstoffe: Milchzucker, Maisstärke und Magnesiumstearat.

**Zulassungsnummer:**  
46529 (Swissmedic)**Wo erhalten Sie SIMILASAN Magenbrennen ? Welche Packungen sind erhältlich?**

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.  
Packungsgröße: 60 Tabletten

**Zulassungsinhaberin und Hersteller:**  
Similasan AG, CH-8916 Jonen

Diese Packungsbeilage wurde im März 2008 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

**Information destinée aux patients**

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le dragueur. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, pharmacien ou dragueur. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

**Quand SIMILASAN brûlures d'estomac est-il utilisé?**

Conformément au schéma thérapeutique homéopathique SIMILASAN brûlures d'estomac peut être utilisé en cas de:

- Brûlures d'estomac (pyrosis)
- Excès d'acide gastrique et renvois acides
- Ballonnements stomacaux ou intestinaux avec renvois acides
- Brûlures à l'estomac après une consommation excessive de café, de tabac et d'alcool

**De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?**

- Si les troubles devaient persister sans interruption et si aucune amélioration ne devait intervenir après deux semaines, consulter un médecin.
- Éviter le café, le tabac et l'alcool.
- Ce médicament contient 0,24 g d'hydrates de carbone digestibles par dose simple.
- Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou pharmacien si SIMILASAN brûlures d'estomac peut être pris simultanément.

**Quand SIMILASAN brûlures d'estomac ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?**

- Aucune limitation d'emploi n'est connue à ce jour. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.

- Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre dragueur si
  - vous souffrez d'une autre maladie,
  - vous êtes allergique,
  - vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

**Comment utiliser SIMILASAN brûlures d'estomac ?**

Sauf prescription contraire du médecin:

- Troubles aigus: Plusieurs fois 1 comprimé par jour (jusqu'à chaque quart d'heure)
- Pour parachever la guérison: 3 fois 1 comprimé par jour.

**Mode d'emploi:**

- Laisser fondre le comprimé dans la bouche (éventuellement mâcher) et bien le répartir avec la langue sur les muqueuses avoisinantes.
- Les comprimés peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou lorsque les troubles reviennent. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge / de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin. Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou dragueur si vous estimatez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

**Quels effets secondaires SIMILASAN brûlures d'estomac peut-il provoquer?**

L'emploi approprié du médicament n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre dragueur. Lors de la prise de médicaments homéopathiques, les troubles peuvent s'aggraver passagèrement (aggravation initiale).

**Mesures en cas d'aggravation des symptômes au début du traitement:**

1. Suspendre l'administration de la préparation jusqu'à ce que la réaction thérapeutique ait cessé.
2. Prendre en une fois 1 comprimé. Attendre l'effet.
3. Si la réaction se répète, agir comme indiqué sous points 1. et 2.
4. Si vous ne ressentez aucune réaction, respectez les recommandations mentionnées sous „Comment utiliser ...“.

Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec SIMILASAN brûlures d'estomac et informez votre médecin, votre pharmacien ou votre dragueur.

**A quoi faut-il encore faire attention?**

- Conserver hors de portée des enfants.
- Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <Exp.> sur le récipient.
- Conserver à température ambiante entre 15 et 25 °C.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre dragueur.

**Que contient SIMILASAN brûlures d'estomac ?**

1 comprimé contient: Calcium carbonicum Hahnemannii D15 / Natrium phosphoricum D12 / Nux vomica (Strychnos nux-vomica) D10 à parts égales 8,33 mg.

Excipients: lactose, amidon de maïs et stéarate de magnésium.

**Numéro d'autorisation:**

46529 (Swissmedic)

**Où obtenez-vous SIMILASAN brûlures d'estomac ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?**

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnement: 60 comprimés

**Titulaire de l'autorisation et fabricant:**

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Cette notice d'emballage a été contrôlée par l'autorité des médicaments (Swissmedic) en mars 2008.

**Bruciori di stomaco****Informazione destinata ai pazienti**

Legga attentamente questo prospetto, perché contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente dal suo medico oppure è stato da lei acquistato in farmacia o drogheria senza ricetta medica. Per ottenere il massimo giovamento da questo preparato, lo utilizzi come descritto nel prospetto interno ovvero attenendosi alle istruzioni che ha ricevuto dal medico, farmacista o dal droghiere. Abbia cura di conservare il prospetto del medicamento, perché eventualmente lo vorrà leggere ancora in un secondo tempo.

**Quando si usa SIMILASAN bruciori di stomaco ?**

Secondo i principi farmacologici dell'omeopatia, SIMILASAN bruciori di stomaco trova impiego nei casi di:

- Bruciore di stomaco (pirosi)
- Acidità di stomaco
- Fermentatione gastro-intestinale accompagnata da acidità di stomaco
- Bruciore di stomaco dopo il consumo eccessivo di caffè, tabacco e alcolici

**Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?**

- Rivolgersi a un medico se i disturbi persistono senza interruzione e non si osserva alcun miglioramento nel giro di due settimane.
- Si consiglia di evitare il consumo di caffè, tabacco e alcolici.
- Questo medicamento contiene 0,24 g di carboidrati digeribili per singola dose.
- Qualora siano stati prescritti altri medicinali da parte del medico curante, consultare il medico o il farmacista per sapere se è possibile assumere contemporaneamente anche SIMILASAN bruciori di stomaco.

**Quando non si può assumere SIMILASAN bruciori di stomaco e quando la sua somministrazione richiede prudenza?**

- Fino ad oggi non si conoscono controindicazioni. Non sono necessarie precauzioni particolari, a condizione che il preparato sia usato correttamente.

- Informi il suo medico, farmacista o droghiere se
  - soffre di altre malattie,
  - ha qualche allergia oppure,
  - prende o applica esternamente (nel caso dei preparati esterni) altri medicamenti!

**Come usare SIMILASAN bruciori di stomaco ?**

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia: Adulti e bambini:

- Sintomi acuti: 1 pastiglia più volte al giorno (fino ad ogni quarto d'ora).
- Fino alla completa guarigione: 1 pastiglia 3 volte al giorno.

**Avvertenze per l'assunzione:**

- Far sciogliere la pastiglia in bocca (eventualmente masticandola) e distribuirla con la lingua sulle mucose della bocca.
- Può essere somministrato anche a stomaco vuoto.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto.

In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

Se il trattamento riguarda un bambino e no si ottiene il miglioramento desiderato, il bambino deve essere visitato da un medico.

Si ritiene che il medicamento agisca troppo o troppo poco, ne parli al medico, al farmacista o al droghiere.

**Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN bruciori di stomaco ?**

Non sono stati finora osservati effetti collaterali in seguito all'impiego corretto di SIMILASAN bruciori di stomaco. Se comunque osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, farmacista o droghiere.

L'assunzione di preparati omeopatici può dar luogo a una temporanea intensificazione dei sintomi (peggioramento iniziale).

**Cosa fare quando i sintomi si acutizzano:**

1. Interrompere la somministrazione fino a quando la reazione si affievolisce.
2. Prendere in una volta 1 pastiglia e aspettare l'effetto.
3. Se la reazione si ripete, comportarsi come descritto ai punti 1. e 2.
4. Se non si avverte più alcuna reazione, attenersi alle raccomandazioni descritte al paragrafo "Come si usa ...".

Qualora il peggioramento dovesse persistere, interrompere l'assunzione di SIMILASAN brucori di stomaco e consultare il medico, il farmacista o il droghiere.

**Di che altro occorre tener conto?**

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il preparato può essere somministrato solo fino alla data <Exp.> indicata sulla confezione.
- Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C).

Ulteriori informazioni possono essere fornite dal medico, dal farmacista o dal droghiere.

**Cosa contiene SIMILASAN bruciori di stomaco ?**

1 pastiglia contiene: Calcium carbonicum Hahnemannii D15 / Natrium phosphoricum D12 / Nux vomica (Strychnos nux-vomica) D10 in parti uguali 8,33 mg.

Excipienti: Lattosio, amido di mais e stearato di magnesio.

**Numeri dell'omologazione:**

46529 (Swissmedic)

**Dov'è ottenibile SIMILASAN brucori di stomaco ? Quali confezioni sono disponibili?**

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione: 60 pastiglie

**Titolare dell'autorizzazione e produttore:**

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglio illustrativo è stato controllato per l'ultima volta nel marzo 2008 dall'autorità competente in materia di medicamenti (Swissmedic).

**Heartburn****Information for patients**

Read this package leaflet carefully since it contains important information. This medicine has either been prescribed for you personally by your doctor, or you have purchased it from a pharmacist or druggist without a medical prescription. In order to obtain the greatest benefit from this medicine, use it according to this package leaflet or as directed by your doctor, pharmacist or druggist. Keep this package leaflet safe, you may want to read it again later.

**When should SIMILASAN heartburn be taken?**

In accordance with homeopathic principles, SIMILASAN heartburn can be taken in cases of:

- Heartburn
- Hyperacidity and acid eructation
- Gastrointestinal fermentation accompanied by acid eructation
- Heartburn caused by excessive consumption of coffee, tobacco products and alcohol

**What precautions should be taken?**

- Consult a physician if the symptoms incessantly persist and there is no improvement after two weeks.
- Smoking and the consumption of coffee and alcoholic beverages should be avoided.
- This medicine contains 0,24 g digestible carbohydrates per single dose.
- If your physician has prescribed other medications, please ask him/her or your pharmacist if you may take SIMILASAN heartburn at the same time.

**When must SIMILASAN heartburn not be taken or taken only with caution?**

- There are no known restrictions on use at present. When used as recommended, no particular precautionary measures are necessary.

- Tell your doctor, pharmacist or druggist if you:
  - are suffering from any other diseases or illnesses,
  - have allergies or
  - are taking other medicines (even those you have bought yourself) by mouth or using them externally!

**How do you take SIMILASAN heartburn ?**

Unless prescribed differently by your physician:

Adults and children:

- In the acute phase: 1 tablet several times a day (up to every quarter hour)
- During resolution: 1 tablet 3 times a day.

**Instructions for administration:**

- Allow the tablet to dissolve in the mouth (chew if necessary) and spread over the surrounding mucous membranes with the tongue.
- May also be taken on an empty stomach.

The period of effectiveness of a medical preparation can vary from person to person. As a rule, always begin another course of treatment when the effect wears off or the symptoms recur. Keep to the dosage given in the package leaflet or prescribed by your doctor. If no improvement is seen in a young child/child, seek the advice of a doctor.

If you think that the medicine is working too little or too strongly, talk to your doctor, pharmacist or druggist.

**What side effects can SIMILASAN heartburn have?**

To date, no side effects have been noted when taking SIMILASAN heartburn according to instructions. However please inform your doctor, pharmacist or druggist if you should notice any side effect. When taking homeopathic medication, the symptoms may at first become more pronounced for a short period (initial exacerbation).

**Measures to take in the case of initial worsening of symptoms:**

1. Stop taking the preparation until the reaction has ceased.
2. Take a single dose of 1 tablet and wait for reaction.

3. If the reaction recurs, proceed as described in 1. and 2. above.
4. If the reaction does not recur, follow the instructions mentioned in "How do you take ...".

Should the worsening of symptoms persist, stop taking SIMILASAN heartburn and inform your physician, pharmacist or druggist.

**What should also be taken into consideration?**

- Keep out of the reach of children.
- The medication may only be taken until the expiry date marked <Exp.> on the container.
- Store at room temperature (15–25 °C).

Further information can be obtained from your physician, pharmacist or druggist.

**What does SIMILASAN heartburn contain?**

1 tablet contains: Calcium carbonicum Hahnemannii D15 / Natrium phosphoricum D12 / Nux vomica (Strychnos nux-vomica) D10 in equal proportions 8,33 mg. Excipients: lactose, corn starch and magnesium stearate.

**Product licence No.:**

46529 (Swissmedic)

**Where can you obtain SIMILASAN heartburn ? How is the preparation presented?**

In pharmacies and drugstores, without medical prescription.

Package size: 60 tablets

**Holder of the product licence and manufacturer:**

Similasan AG, CH-8916 Jonen

The latest examination of this package leaflet was carried out in March 2008 by the Federal Authorities for Medication (Swissmedic).